

Segregatie richtlijnen CF-team Maastricht

Werkwijze bij de verpleging en/ of behandeling van de Cystic Fibrosis- patiënten (CF)

Infectiepreventieve maatregelen bij de verpleging en/ of behandeling van de CF- patiënt.

Specialisme: Kindergeneeskunde, Longziekten, Maag-Darm-Leverziekten, Fysiotherapie, Diëthetiek, Maatschappelijk werk, Functieafdelingen, overige verpleegafdelingen.

Samenvatting

In dit protocol wordt de werkwijze beschreven die gevolgd dient te worden bij de verpleging en/of behandeling van een poliklinisch of klinisch opgenomen patiënt met CF.

Cystic Fibrosis (CF), ook wel pancreasfibrose, mucoviscidosis of taaislijmziekte genoemd is een erfelijke ziekte.

Vaak zijn CF- patiënten gekoloniseerd met al of niet resistente micro- organismen zoals: *Pseudomonas aeruginosa*, *Stafylococcus aureus* en *Burkholderia cepacia*.

Verspreiding van resistente vormen van deze bacteriën (onder andere MRSA) van en naar CF- patiënten en/ of patiënten met chronisch longlijden of patiënten met verminderde algemene weerstand dient vermeden te worden.

De overdracht kan tot stand komen door rechtstreeks contact of indirect contact met de bronpatiënt. Indien CF- patiënten multiresistente micro- organismen bij zich dragen zijn infectiepreventieve maatregelen aangewezen bij de verzorging en behandeling.

Doel

Zorg dragen voor het nemen van maximale infectiepreventie maatregelen bij CF- patiënten zowel ter bescherming van de patiënt zelf als ter bescherming van medepatiënten en medewerkers. Het naleven van een strikte hoest- en handhygiëne door de CF- patiënten, het bezoek en de ziekenhuismedewerkers.

Uitvoerenden en verantwoordelijken

Alle ziekenhuismedewerkers die met CF-patiënten en/of met verpleegkundige of medische hulpmiddelen , die ingezet zijn bij CF- patiënten in aanraking komen.

Indicaties

- Poliklinische behandeling van CF- patiënten in het azM, inclusief functieafdelingen en fysiotherapie;
- Klinische opname van CF- patiënten in het azM.

Veiligheid

Een goede hoest- en handhygiëne van de patiënt of bezoekers evenals van de therapeuten of medewerkers die direct patiëntencontact hebben is gewenst.

Derhalve is de aanwezigheid van een handdesinfectans en tissues in de wachtruimte/ onderzoeks-/ spreekkamer noodzakelijk.

Plan CF- patiënten zodanig in dat ze niet samen met andere CF- patiënten in één ruimte verblijven voor onderzoeken en/ of behandeling.

Werkwijze

- Kinderen met CF worden op de kinderafdeling (B2) op een één- of een meerpersoonskamer opgenomen.
Indien opname op een meerpersoonskamer: **niet** samen met een CF- patiënt, een patiënt met (chronische) longproblematiek of een patiënt met verminderde weerstand.
- Volwassen CF- patiënten worden opgenomen op een éénpersoonskamer op de longafdeling (A3).
- Indien er geen plaats beschikbaar is op A3 mag een CF- patiënt, totdat een éénpersoonskamer beschikbaar is op A3, verpleegd worden in een meerpersoonskamer op een andere afdeling waarbij evt. de medepatiënten geen CF- patiënt zijn, geen (chronische) longziekte hebben of geen verminderde weerstand hebben.

Handeling

A. bij klinische opname van een CF- patiënt op de verpleegeenheid:

- De behandelaar die de opname indiceert, regelt al dan niet via Bureau Opname een éénpersoonskamer voor de CF- patiënt (A3) of (indien het een kind betreft) een kamer op B2.
- Indien er geen éénpersoonskamer op A3 beschikbaar is draagt de behandelaar er zorg voor, in overleg met de leidinggevende van de betrokken afdeling, dat de CF- patiënt hooguit naast een andere patiënt komt te liggen die niet lijdt aan CF, geen (chronische) longaandoening of geen verminderde weerstand heeft.
- Indien de CF-patiënt reeds vóór opname bekend is met kolonisatie of een infectie met multiresistente micro- organismen, zijn isolatiemaatregelen noodzakelijk.

B. bij poliklinisch bezoek of behandeling:

- Plan de afspraak zo in dat onderling contact met andere CF- patiënten vermeden wordt (indien multiresistente micro-organismen aanwezig aan het einde van het dagprogramma);
- Na de afspraak worden op de kamer van de CF-verpleegkundige de vervolgspraken gemaakt of verlaat de patiënt direct de polikliniek en worden de afspraken opgestuurd (hiermee wordt vermeden dat de patiënt onnodig lang in de openbare ruimtes van de polikliniek verblijft).
- Reinig visueel verontreinigde werkoppervlakken met een huishoudelijk reinigingsmiddel.
- Desinfecteer de werk-/ contactoppervlakken inclusief verpleegkundige en medische hulpmiddelen, die in aanraking zijn geweest met de CF- patiënt met alcohol.